



ICTニュース



Infection Control Team News VOL.2 2018年 5月 21日 発行責任者
米の山病院感染対策委員会

福岡県でも発生！麻疹(はしか)



麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症。
感染力はきわめて強く、麻疹の免疫を持たない人が感染するとほぼ100%症状が現れます。
一度感染すると一生免疫が持続すると言われています。



こういう時どうしたらいい？麻疹Q&A



Q.これから沖縄へ行く予定ですがどうしたらいい？

A.ワクチン接種歴を確認してください。
2回接種が完了していなければ、接種をお願いします

Q.大人でも注意した方がいい？

A.これまで麻疹にかかっていない、あるいはワクチン接種していなければかかります。発熱、発疹に加え肺炎や脳炎などを合併し重症化する場合があります。

Q.1歳未満の子供を連れて行きたいが、どうしたらいい？

A.定期接種では、基本的に1歳未満の子供への接種は行っていません。
麻疹の流行が終息した後に行かれることが安心です。
旅行の中止または自費での予防接種を行ってもらうか検討して下さい。

Q.妊婦と一緒に行って大丈夫？

A.2回の予防接種が完了していない妊婦の方は、終息してから行かれることが安心です。
妊娠中に麻疹にかかると、「早産」や「流産」のリスクが高くなります。
妊娠中は赤ちゃんへの影響を避けるため、予防接種はできません。

Q.自分自身が高齢で、麻疹にかかったかワクチンを打ったかわからないけど…？

A.概ね、50歳以上の年齢、特にご高齢の方は、ワクチンがなかった時代に麻疹にかかっていると考えられます。
基本的には麻疹にかかりません。

麻疹にかかったことがあるかどうか
ワクチン接種を何回受けているか
確認をお願いします！
記憶ではなく記録で確認しましょう！



★読まれた方はサインをして下さい。未読者がががないように声掛けをお願いします★
